

BULLETIN TECHNIQUE DE LA
STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
du LANGUEDOC-ROUSSILLON

(Aveyron, Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales)

MONTPELLIER — 16, Rue de la République — TÉL. M2 58-72

1ère année

4 Août 1953

N° 21

INFORMATIONS

TORDEUSE.

Effectuer, dès maintenant, sur les fruits devant être récoltés au début du mois de Septembre, un traitement à l'aide de Parathion ou de D.D.T.

Répéter ce traitement de 10 jours en 10 jours.

L'OIDIUM DE L'ABRICOTIER, DU PECHER ET DU POMMIER.

L'été 1953 est très favorable au développement de l'Oïdium. Dans les vergers et les pépinières où l'on redoute les attaques d'Oïdium, faire un traitement en utilisant :

- soit un soufre micronisé,
- soit un soufre dispersé.

Pour éviter des brûlures, traiter en dehors des heures chaudes de la journée, le soir de préférence, et réduire les doses de soufre en fonction de la température

- 250 g. de soufre, au maximum, pour les sulfures micronisés,
- 500 g. de soufre, au maximum, pour les sulfures dispersés.

L'OIDIUM DU MELON.

C'est une des maladies cryptogamiques les plus graves du melon. Traiter préventivement, en appliquant :

- soit un soufrage léger (éviter la formation de paquets de soufre), le soir ou le matin de bonne heure pour les variétés peu sensibles au soufre, telles que Melons Charentais.

- soit des bouillies sulfocalciques que l'on répand dans les eaux d'arrosage.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,

P. BERVILLE.

Le Contrôleur chargé
des Avertissements Agricoles,

L.L. TROUILLON.

Reproduction ou adaptation réservées - Autorisation du 23 Janvier 1953
Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles - 16 rue de la République,
MONTPELLIER - Le Gérant : R. BERTRAND



22 B